

		date floraison	Sépales	Pétales	Labelle								
			longueur / au labelle	longueur forme	taille	forme labelle	pilosité marginale distale	gibbosités	champ basal		cavité stigmatique		
								forme	couleur	limite avec le champ basal	forme	couleur	
Groupe Druentica	<i>O. druentica</i>	mi-mai	un peu plus long	moyens hastés, allongés	grand	rectangle allongé, anguleux	nulle à faible	fortes	court	sombre à concolore au labelle	continuité	haute, parfois resserrée à la base ; coupole basse	sombre
Groupe Fuciflora	<i>O. fuciflora</i>	mi mai - début juin	de la même taille	triangulaires moyens, plus ou moins hastés	grand	trapèze arrondi, bord récurvés ou non	nulle	faibles, arrondies	long	plus clair que le labelle, brun orangé vif	ligne claire	large et basse	sombre, vert sale, brun vert
	<i>O. aegirtica</i>	début juin	nettement plus longs	triangulaires assez courts hastés	grand	trapèze arrondi, bord non récurvés	faible à nette	faibles, arrondies	long	plus clair que le labelle, orangé vif	continuité	large et basse	brun orangé à orange vif
	" <i>Ophrys du Mont des Oiseaux</i> "	début juin	nettement plus courts	triangulaires moyens, faiblement hastés, étroits	grand	trapèze arrondi à globulaire, bords récurvés	nulle	plus ou moins pointues, assez courtes	long	plus clair que le labelle, brun orangé vif	ligne noire à l'extérieur, jaune à l'intérieur	large et basse	vert brunatre
	" <i>Ophrys du Comtat</i> "	début juin	de la même taille à un peu plus courts	triangulaires moyens, hastés, étroits	moyen	trapèze, bords récurvés	nulle à faible	faibles, arrondies	long	plus clair que le labelle, brun orangé vif	limite nette, parfois trait jaune	large et très basse	brun gris sombre
Groupe Pseudocolopax - Linéaris	<i>O. linearis</i>	mi mai	de la même taille	longs, étroits bords parallèles	moyen	en trapèze	nulle	fortes, étroites, pointues	très court, échancré, souvent bissecté	concolore au labelle ou plus sombre	continuité	rectangle à coins arrondis	verdâtre, plus claire que le champ basal
	<i>O. pseudocolopax</i>	mi-avril début mai	de la même taille ou un peu plus longs	longs, étroits, plus ou moins hastés	moyen	arrondi, globulaire	nulle à faible	fortes, obtuses, dirigées vers l'intérieur	moyen, parfois bissecté	plus clair que le labelle, zoné de brun rouge à brun sombre	continuité	ovalaire, basse	sombre
	" <i>taxon de l'est du Var</i> "	fin avril - début mai	un peu plus longs	triangle allongé, peu hastés	moyen	quadrangulaire rectangle un peu plus long	nulle à faible	assez fortes triangulaires, parfois courtes arrondies	court à moyen	brun rouge plus clair que le labelle	changement de couleur, parfois une ligne blanche	elliptique assez basse	sombre, brun noirâtre

		date floraison	Sépales	Pétales	Labelle								
			longueur / au labelle	longueur	forme	taille	forme labelle	pilosité marginale distale	gibbosités	champ basal		cavité stigmatique	
									forme	couleur	limite avec le champ basal	forme	couleur
	"Ophrys du Tricastin"	mi mai	de la même taille ou un peu plus longs	courts , triangle à base assez large	moyen	rectangulaire ou en trapèze	très nette	assez fortes, triangulaires, parfois arrondies	moyen	brun rouge, un peu plus clair que le labelle	nette changement de couleur	basse, ellipse, rectangle coins arrondis	gris vert plus ou moins sombre
Groupe <i>Elatior</i>	<i>O. elatior</i>	fin juin - septembre	un peu plus courts	moyens, étroits, plus larges à la base	petit	rectangulaire à trapézoïdal, arrondi	nette à forte	très courtes, peu marquées	long	brun orangé, brun rouge, plus clair que le labelle	contraste de couleur faible à net	basse, rectangulaire à trapèze inversé	sombre, vert sale sur les bords
	<i>O. du Roubion</i>	mi-juin - début juillet	un peu plus courts	moyens, parfois hastés	petit	rectangulaire à trapézoïdal, arrondi	nette à forte	faibles, arrondies	long	brun orangé, brun rouge, plus clair que le labelle	trait vert jaune ou rien	anse de panier, basse	vert grisâtre sombre
	<i>O. gresivaudanica</i>	fin juin - juillet	un peu plus longs	moyens, étroits	petit	rectangulaire à trapézoïdal, arrondi ; souvent scolopaxoïde	nette à forte	faibles arrondies	long	brun orangé, brun rouge, plus clair que le labelle	trait clair peu marqué à absent	anse de panier, basse	vert grisâtre sombre
Groupe <i>Gracilis</i>	<i>O. gracilis</i> (Drôme Ardèche)	mi-mai à début juin	plus longs	courts et larges, souvent hastés	petit	rectangle arrondi à globulaire, bombé	nulle	très faibles, arrondies, parfois plus aigues	long	brun rouge, concolore au labelle ou plus clair	contraste de couleur, parfois trait blanchâtre	elliptique basse, coupole basse	très sombre, zoné de vert sale à noir

Clef du complexe fuciflora (d'après M.DEMANGE)


1) TAILLE DU LABELLE	2) CHAMP BASAL	3) FORME DU LABELLE	4) GIBBOSITES	PILOSITE MARGINALE	5) LONGUEUR SEPALES/LABELLE	
Grand > 14mm	Court 	Quadrangulaire 	Fortes	Nulle	> ou = 	<i>O.drumentica</i>
	Concolore ou plus sombre	Allongé			=	<i>O.fuciflora</i>
	Long 	Trapézoïdal 	Courtes Arrondies	Nulle	>	<i>O.aegirtica</i>
	Plus clair que labelle	Arrondi			< < ou =	<i>O.aegirtica du Mont des Oiseaux</i> <i>O.aegirtica du Vaucluse</i>

1) TAILLE DU LABELLE	2) PILOSITE MARGINALE	3) FORME DU LABELLE	4) GIBBOSITES	CHAMP BASAL	5) PETALES	
Moyen 10 - 14mm	Très faible à nulle	Étalé en trapèze 	Assez fortes	Court Concolore au labelle	Longs > 1/2 sépales	<i>O.linearis</i>
	Très faible à nulle	Arrondi, globulaire 	Assez fortes	Plus clair que labelle	Longs > 1/2 sépales 	<i>O.pseudoscolopax</i>
	Nette		Assez fortes	Plus clair que labelle	Moyens < 1/2 sépales 	<i>O.lorenae du Tricastin</i>

Clef du complexe fuciflora (d'après M.DEMANGE)


1) TAILLE DU LABELLE	2) PILOSITE MARGINALE	3) FORME DU LABELLE	4) GIBBOSITES	CHAMP BASAL	PETALES	
<p>Petit < 10mm</p>	<p>Nulle</p>	<p>Arrondi, bombé</p> 	<p>Faibles</p>	<p>Long</p>	<p>Courts et larges</p>	<p><i>O.gracilis (Drôme/Ardèche)</i></p>
	<p>Nette</p>	<p>Quadrangulaire à trapézoïdal</p> 	<p>Faibles, arrondies</p>	<p>Long</p> 	<p>Courts et larges</p>	<p><i>O.elatior</i> <i>O.du Roubion</i> <i>O.gresivaudanica</i></p>

		Période de floraison	Localisation	Photo du type	
Groupe Druentica	<i>O. druentica</i>	mi mai		 <p><i>Ophrys druentica</i> 15/05/11 - St Genis (05)</p>	 <p><i>Ophrys druentica</i> 15/05/11 - St Genis (05)</p>


		Période de floraison	Localisation	Photo du type
Groupe Fuciflora	<i>O. fuciflora</i>	mi mai à début juin		
	<i>O. aegirtica</i>	début juin		

		Période de floraison	Localisation	Photo du type
Groupe Fuciflora	« <i>Ophrys aegirtica</i> du Mont des Oiseaux »	début juin	 <p><i>Ophrys pseudo-aegirtica</i> du Vaucluse du Mont des Oiseaux</p>	
	« <i>Ophrys aegirtica</i> du Vaucluse » ou « <i>Ophrys</i> du Comtat »	début juin	 <p><i>Ophrys sub-aegirtica</i> du Vaucluse du Mont des Oiseaux</p>	

		Période de floraison	Localisation	Photo du type
Groupe <i>Pseudoscolopax</i> - <i>Linearis</i>	<i>O. linearis</i>	mi mai	?	
	<i>O. pseudoscolopax</i>	mi avril début mai		 17/04/11 - Lavera (23) GL
	"taxon de l'est du Var"	fin avril à début mai		 17/04/11 - Lavera (13)

		Période de floraison	Localisation	Photo du type	
	<p><i>"Ophrys lorenae du Tricastin"</i></p>	<p>mi mai</p>	 <p><i>Ophrys sublorenae</i></p>	 <p>20/04/14 - St. Genès (26) GL</p>	 <p>20/05/14 - Ouziers (26) GL</p>

		Période de floraison	Localisation	Photo du type
Groupe Elatior	<i>O. elatior</i>	fin juin à septembre		
	<i>O. du Roubion</i>	mi juin à début juillet		

		Période de floraison	Localisation	Photo du type
Groupe Elatior	<i>O. gresivaudanica</i>	fin juin à juillet		
		Période de floraison	Localisation	Photo du type
Groupe Gracilis	<i>O. gracilis</i> (Drôme/Ardèche)	mi mai à début juin		